



# LA CLAVE PARA UNA BUENA VIDA ES UN GRAN PLAN

# Health TALK



## ¿Qué opina?

Es posible que dentro de algunas semanas reciba por correo una encuesta. En ella, le preguntamos su grado de satisfacción con UnitedHealthcare Community Plan. Si recibe la encuesta, le agradeceremos que la responda y nos la envíe por correo. Sus respuestas serán confidenciales, y su opinión nos ayuda a mejorar el plan de salud.



## Evite la sala de emergencias.



**Sepa a dónde ir y cuándo hacerlo.**

Para la mayoría de las enfermedades y lesiones, el consultorio de su proveedor de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) debe ser el primer lugar al que debe llamar cuando necesite atención médica. Incluso puede llamar en la noche o los fines de semana.

Si no puede ir a su médico, tiene la opción de acudir a un centro de atención de urgencia. Allí atienden a los pacientes sin cita previa. Muchos centros de atención de urgencia atienden en la noche y los fines de semana.

Las salas de emergencias (emergency rooms, ER) son solo para emergencias médicas importantes. Solo acuda a ellas si cree que su enfermedad o lesión puede causarle la muerte o una discapacidad si no se trata de inmediato. Si acude por una enfermedad o una lesión menor, es posible que tenga que esperar mucho tiempo.



**¡Hola, enfermera!** UnitedHealthcare tiene una línea de enfermería, NurseLine<sup>SM</sup>, que atiende las 24 horas, los 7 días de la semana. Una enfermera puede ayudarle a decidir cuál es el mejor lugar para recibir atención médica. Llame a la línea de enfermería al **1-800-464-9484, TTY 711**.



## Vacunas para preadolescentes.

Cuando su hijo cumpla 11 o 12 años, es hora de otra ronda de vacunas. Estas se administran en el control anual de su hijo preadolescente. Estas vacunas ayudan a proteger a sus hijos, amigos y familiares contra enfermedades graves. La próxima vez que lleve a su hijo preadolescente al médico, pregunte acerca de las siguientes vacunas:

- **VPH:** Previene el virus del papiloma humano.
- **Conjugado meningocócico:** Previene la meningitis bacteriana.
- **Tdap:** Previene el tétano, la difteria y tos ferina.

Si a su hijo le falta alguna de estas vacunas, no es demasiado tarde para administrárselas.



### Es su mejor opción.

Obtenga más información sobre las vacunas para cada miembro de su familia en [CDC.gov/vaccines](https://www.cdc.gov/vaccines).



## La mitad de su plato.

Una deliciosa búsqueda de palabras.

Intente llenar la mitad de su plato con frutas y verduras. Así se asegurará de obtener la cantidad correcta de estos alimentos vitales. Encuentre algunos productos conocidos en la siguiente búsqueda de palabras.

MANZANA  
PLÁTANO  
ZANAHORIA

BRÓCOLI  
APIO  
FRESA

NARANJA  
ESPINACA

F	M	A	P	N	E	G	I	U	Z
Q	R	U	N	V	X	L	Z	A	H
O	C	E	A	A	O	I	N	P	I
N	Z	S	S	C	Z	A	I	I	B
A	Y	O	Ó	A	H	N	W	O	A
T	E	R	X	O	D	O	A	V	G
Á	B	H	R	U	E	I	F	M	Z
L	A	I	N	A	R	A	N	J	A
P	A	A	C	A	N	I	P	S	E
V	T	J	C	Y	N	V	M	V	D



**¡A comer!** Obtenga más información sobre la buena alimentación en [ChooseMyPlate.gov](https://www.ChooseMyPlate.gov).



## Quédese tranquilo.

La temporada de gripe está en pleno apogeo. El virus de la gripe se propaga fácilmente durante los meses más fríos.

Por lo general, la gripe se presenta repentinamente. Es probable que tenga fiebre y se sienta adolorido y cansado. La gripe a menudo causa tos, dolor de garganta y congestión nasal. A algunas personas les duele la cabeza o el estómago.

La gripe no tiene cura, pero el cuidado puede ayudarle a sentirse un poco mejor hasta que pase. Tome un antipirético o un analgésico, descanse bastante, beba una gran cantidad de agua y quédese en casa para no contagiar la gripe a otras personas.

La mejor forma de prevenir la gripe es mediante una vacuna anual contra la gripe. No es demasiado tarde para vacunarse esta temporada. Se recomienda para todas las personas a partir de los seis meses de edad. Pregunte a su PCP sobre esta vacuna.



**Conozca a su proveedor.** Consulte a su proveedor de atención primaria para un control antes de enfermarse. ¿Necesita encontrar un nuevo PCP? Visite

[myuhc.com/CommunityPlan](http://myuhc.com/CommunityPlan) o llame gratis al **1-800-464-9484**, TTY 711.

# La dosis correcta.

## Cómo encontrar el mejor tratamiento para el TDAH de su hijo.

Si su hijo tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), posiblemente su proveedor sugiera algún medicamento. Existen diversos tipos de medicamentos para tratar el TDAH. Puede tomar un tiempo encontrar cuál es el mejor medicamento para su hijo.

Es probable que su hijo tenga que cambiar de medicamento o posología un par de veces, ya que posiblemente algunos no le sirvan. Otros pueden causar efectos secundarios. Una dosis puede ser muy baja o demasiado alta.

Por ello es tan importante que los niños que toman un medicamento para el TDAH vayan al médico con frecuencia. Acuda al médico dentro de los 30 días siguientes a que su hijo comience a tomar el medicamento. Vaya nuevamente dos veces en los siguientes nueve meses. Luego, no olvide ir a las citas periódicas. La terapia del comportamiento y orientación también pueden ayudar.

## Pregunte al Dr. Health E. Hound®.

### P: ¿Por qué debe someterse mi hijo a una prueba de detección de plomo?

**R:** El plomo se encuentra por lo general en las tuberías o la pintura de las casas más antiguas. Los niños pueden inhalarlo o tragarlo. Demasiado plomo en el organismo de un niño causa envenenamiento por plomo, que puede afectar la sangre, los huesos o el cerebro de un niño. También puede causar retrasos en el crecimiento o problemas de desarrollo.

Muchos niños con envenenamiento por plomo no tienen síntomas. Por ello, es muy importante llevar a cabo las pruebas pertinentes. Los expertos recomiendan llevarlas a cabo al año y a los 2 años. La prueba de detección de plomo forma parte del control de niño sano en estas edades. La prueba se realiza con unas pocas gotas de sangre.



**Obtenga información sobre el plomo.** Lea acerca del envenenamiento por plomo y otros temas de salud infantil. Visite [UHC.com/IAkids](http://UHC.com/IAkids).





## Rincón de recursos.

**Servicios para miembros:** Encuentre un médico, haga preguntas sobre los beneficios o exprese una queja, en cualquier idioma (llamada gratuita).

**1-800-464-9484, TTY 711**

**Nuestro sitio web y aplicación:** Encuentre un proveedor, lea su Manual para miembros o vea su tarjeta de identificación, dondequiera que se encuentre.

**[myuhc.com/CommunityPlan](http://myuhc.com/CommunityPlan)  
Health4Me™**

**NurseLine<sup>SM</sup> (Línea de enfermería):** Obtenga consejos de salud de una enfermera las 24 horas del día, los siete días de la semana (llamada gratuita).

**1-800-464-9484, TTY 711**

**MyHealthLine™:** Si reúne los requisitos, puede recibir un teléfono inteligente y un plan de servicio mensual gratis.

**[UHCmyHealthLine.com](http://UHCmyHealthLine.com)**

**Text4baby:** Reciba mensajes de texto GRATIS en su teléfono celular cada semana de acuerdo con su etapa del embarazo. Inscribese **enviando la palabra BABY o BEBE al 511411**. Luego, ingrese el código de participante HFS.

**Healthy First Steps®:** Reciba apoyo durante su embarazo.

**1-800-599-5985, TTY 711**

**Baby Blocks™:** Reciba recompensas por atención oportuna prenatal y de bebé sano.

**[UHCBabyBlocks.com](http://UHCBabyBlocks.com)**

**KidsHealth®:** Obtenga información confiable sobre temas de salud para y acerca de los niños.

**[UHC.com/IAkids](http://UHC.com/IAkids)**

# Bienestar del bebé.

## Tratamiento para el trastorno de consumo de opiáceos para mujeres embarazadas.

Las sobredosis de drogas constituyen actualmente la causa de muerte principal en personas menores de 50 años. El reciente aumento en las muertes causadas por sobredosis se debe a un fuerte incremento en el consumo de opiáceos. Entre los opiáceos se encuentran analgésicos de venta con receta como Vicodin y Oxycodona. También incluyen heroína y drogas sintéticas de elaboración ilegal, como fentanilo.

Muchas personas que se vuelven adictas a los opiáceos comenzaron a usarlos cuando se los recetaron para aliviar el dolor. Otras han utilizado indebidamente las pastillas que le han quedado a algún amigo o familiar. Nadie es inmune a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Inclusive las mujeres embarazadas.

Las mujeres que consumen opiáceos durante el embarazo ponen en riesgo de daño a sus bebés. Los bebés pueden nacer demasiado prematuros o adictos a los opiáceos. La abstinencia de opiáceos es muy difícil en los recién nacidos y puede causar problemas de salud y de desarrollo duraderos.

El tratamiento puede ayudar a las mujeres que son dependientes de los opiáceos a tener bebés más sanos. Se recomienda tratamiento asistido con medicamentos (Medication-assisted treatment, MAT). Este tratamiento apoya a las mujeres hasta su recuperación con medicamentos que bloquean el deseo imperioso de consumir opiáceos y disminuyen los antojos de consumirlos. El medicamento también facilita la abstinencia de los pacientes de los opiáceos. Mediante asistencia con los aspectos físicos de la adicción, MAT ayuda a los pacientes a centrarse en otros aspectos de la recuperación.



**¿Necesita ayuda?** El tratamiento para los trastornos por consumo de sustancias, incluido MAT, es un beneficio cubierto para todos los miembros. Llame a la Línea de ayuda para tratamiento para el consumo de sustancias las 24 horas del día, los siete días de la semana al **1-855-780-5955** para comenzar la recuperación.